

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Desinfectante de amplio espectro frente a toda clase de microorganismos tales como bacterias, virus, hongos, esporas, así como conidios, microconidios y clamidosporas. Formulado en base a glutaraldehído y amonio cuaternario de última generación. Es eficaz en presencia de aguas duras, materia orgánica y no es corrosivo ni tóxico en condiciones normales de uso y dosificación. Recomendado para la desinfección de: Industrias, herramientas, utensilios, vehículos, superficies, mesas de trabajo, pediluvios, arcos de desinfección.



Composición (Solución desinfectante)

Glutaraldehído 15,00%

Cloruro de Didecil Dimetil Amonio 10,00%

DOSIS:

- Para desinfección en presencia de patógenos específicos: 1% (10ml en 1L de agua).
- Para desinfección general de superficies: 0,3-0,5% (3-5 ml en 1L de agua) para 10m². Con la cual alcanzamos 750-1250ppm.
- Para desinfección de herramientas, utensilios, vehículos, mesas de trabajo, arcos de desinfección y pediluvios: 0,5-1% (5-12 ml en 1L de agua). Con la cual alcanzamos 1200-3000ppm.
- Para desinfección de suelos pre-siembra: 0,3%. (3 ml en 1L de agua).
- Para Termo nebulización: Utilizar al 10%, con una descarga de un litro por cada 3000 metros cúbicos.

MODO DE EMPLEO:

Se puede aplicar mediante forma de espuma, pulverización, baldeo, inmersión, atomización, nebulización, termonebulización. Disolver previamente en un tanque la dosis necesaria y aplicar sobre la superficie a tratar. Se recomienda la medición previa a la utilización de la solución, mediante tiras reactivas, de la dosis para asegurar la actividad del desinfectante.

. Recomendado como medida de exclusión de *Fusarium Oxysporum* (Pruebas con CORBANA, 2019) así como para *Ralstonia solanacearum*, causante del

Moko.

ALMACENAMIENTO

Los productos biocidas deben almacenarse en lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol. Una vez abierto, mantener bien cerrado el envase. A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir reduciendo su estabilidad.

Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar. Se recomienda limpiar con detergente antes de desinfectar.

VENTAJAS

- Amplio espectro de acción a muy bajas dosis.
- Registrado para todos los ámbitos de uso.
- La formulación permite una mezcla perfecta de ingredientes activos, que actuando en sinergia les permite controlar a una menor dosis, en solo unos segundos, con mayor persistencia, en presencia de aguas duras, en presencia de aguas jabonosas y en presencia de materia orgánica.

REGISTRO

Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica: ES-15-6-6297

Ministerio de Salud: Q-18-00335

Ministerio de Agricultura y Ganadería Guatemala: ES-884-15-04-9743

Hongos y esporas

Fusarium oxysporum

Aspergilosis Aspergillus spp.

Ralstonia solanacearum

Candidiasis Candida albicans

Mycosphaerella fijiensis

Virus

Amplio espectro de control en Virus como: Rotavirus, Coronavirus, etc.

Síndrome de Baja postura ADENOVIRIDAE

Enteritis hemorrágica aviar ADENOVIRIDAE

Enfermedad de GUMBORO BIRNAVIRIDAE

Anemia infecciosa aviar CIRCOVIRIDAE

Bronquitis infecciosa CORONAVIRIDAE

Enfermedad de MAREK	HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar	HERPESVIRIDAE
Influenza aviar	ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE	PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar	POXVIRIDAE
Peste porcina africana	ASFARVIRIDAE
PRRS	ASTERVIRIDAE
Circovirus porcina	CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica o cólera porcino	FLAVIVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY	HERPESVIRIDAE
Parvovirus porcino	PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado	PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos	POXVIRIDAE

Bacterias

Bacillus	
Clostridium	
Lactobacillus	
Aspergillus	
Campylobacteriosis	Campylobacter spp.
Colibacilosis	Escherichia coli
Coriza infeccioso ...	Haemophilus paragallin.
Listeriosis	Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis	Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa	Mycoplasma synoviae
Pasteurellosis aviar	Pasteurella multocida
Salmonelosis	Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar...	Salmonella spp.
Staphylocosis	Staphylococcus spp.
Streptocosis	Streptococcus spp.
Bordetellosis	Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina	Brachyspira hyodysenteriae
Brucelosis	Brucella spp.
Erysipela	Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli	Escherichia coli
Artritis	Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia	Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa ...	Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina	Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia ...	Clostridium spp.
Tuberculosis bovina	Mycobacterium bovis