

Hoja técnica



Formulado:
Allister de México S.A. de C.V.
Av. Circunvalación Sur No. 5
Col. Las Fuentes, C.P. 45070
Zapopan, Jalisco, México
Conmutador: (33) 31 33 00 13
(33) 31 33 98 16
e-mail: allister@allister.com.mx

Registro: RSCO-DOM-INAC-0111-X0005-013-0.10



Toxicidad

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Centro de Información
Toxicológica: (ATOX)

01 800 000 2896

Clasificación



UN: 3352 PLAGUICIDA PIRETROIDEO,
LIQUIDO, TOXICO.

Nombre Comercial:

Información general

CYBOR LISTO®

Descripción:

Insecticida piretroide especialmente diseñado para ser usado en forma directa, no necesita mezclarse con agua u otras sustancias.

Ingrediente activo:

Cipermetrina (1.00 g de i.a/l)

Familia química:

Piretroide

Nombre químico:

(RS)-α-ciano-3-fenoxibencil (1 RS,3RS; 1RS, 3SR)- 3-(2,2-diclorovinil)-2, 2- dimetilciclopropanocarboxilato

Mecanismo de acción:

La cipermetrina es un insecticida, no sistémico, no volátil que actúa por contacto e ingestión. Sobre el insecto se origina una excitación primaria del Sistema Nervioso Periférico, que hace que el insecto agite sus miembros y alas, alejándose del lugar de tratamiento. Luego se absorbe a través del exoesqueleto, por lo cual se estimula el sistema nervioso central. Una vez ingresado el insecticida al cuerpo del insecto, provoca una parálisis del Sistema Nervioso Central (período de residencia) y el insecto queda parálítico. Al no poder alimentarse, muere por inanición.

Tipo de formulación:

Solución acuosa.

Ingrediente activo	% en peso
Cipermetrina	0.10
Otros ingredientes	99.90
Total	100.00

Recomendaciones de Uso:

Plagas	Aplicación
Piojos (<i>Rhodnius prolixus</i>) Chinches (<i>Cimex lecturalis</i> , <i>Triatoma infestans</i>) Pulga (<i>Pulex irritans</i>) (<i>Ctenocephalides canis</i>) <i>(Ctenocephalides felis)</i> Mosquito Aedes (<i>Aegypti</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Culex spp</i>) Mosca doméstica (<i>Musca domestica</i>) Hormiga de Faraón (<i>Manomorium pharaonis</i>) Hormiga de Fuego (<i>Solenopsis xyloni</i>) Avispa (<i>Vespula spp</i>) Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha germánica (<i>Blattella germanica</i>) Alacrán (<i>Centruroides spp</i>) Arañas (<i>Latrodectus spp</i>)(<i>Loxosceles spp</i>) Tijerillas (<i>Forficula spp</i>) (<i>Euborellia annulipes</i>) Termita de madera seca (<i>Incisitermes spp</i> , <i>Cryptotermes spp</i>) Escarabajo de la madera (<i>Anobium Punctatum</i>) Hormiga carpintera (<i>Camponotus spp</i>) Abeja carpintera (<i>Xylocopa spp</i>) Termita subterránea (<i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Coptotermes formosanus spp</i>)	Para el control de insectos voladores Cierre puertas y ventanas antes de aplicar el rocío. Agite bien el producto antes de usar. Aplique un ligero rocío evitando que las gotas caigan sobre la piel, en caso de ocurrir lo anterior lave el área con agua. Siga correctamente las instrucciones de uso, de tal manera que no aplique demasiado insecticida. Después de rociar el producto en la habitación, salga y mantenga cerrado hasta 20 minutos, una vez transcurrido el tiempo abra puertas y ventanas para ventilar e ingrese al área tratada. Para el control de insectos rastreros: Agite bien el producto antes de usar. Aplique en los sitios por donde caminan o se refugian los insectos. Evite aplicar excesos de insecticida. Aplique hasta que la superficie quede ligeramente húmeda. Para el control de cucarachas es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Al aplicar sobre equipos electrónicos como: Lavadoras, microondas, refrigeradores, estufas, etc. Desconecte antes de aplicar el producto.

Método para aplicar el producto:

CYBOR LISTO® es un insecticida piretroide especialmente diseñado para ser usado en forma directa, no necesita mezclarse con agua u otras sustancias. Puede ser aplicado en interiores, casas habitación. Cocinas, baños, oficinas, bodegas, perreras, departamentos, desvanes y exteriores, para el control de insectos rastreros y voladores. No tiene olor ni mancha paredes o ropa.

Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación.