

¡ALTO!

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Composición porcentual

Ingrediente Activo: Abamectina: Avermectina B1a, mezcla de avermectinas

Conteniendo no menos del 80% de avermectinas B1a y no mas del

20% de avermectinas B1b

No menos de..... 0.05 %

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Este producto es ligeramente tóxico, evite la ingestión y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua corriente y en caso de ingestión y el paciente esta consciente, administre una dilución de carbón activado.

Utilice guantes al aplicar el producto. Lávese bien las manos con agua y jabón después de la aplicación.

- Antes de aplicar este producto proteja los alimentos y enseres de la cocina
- No se aplique en presencia de personas y animales domésticos.
- No se reutilice este envase.
- Evítese el contacto con los ojos.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte

"No almacene ni transporte junto a productos alimenticios y ropa".

Almacenar el producto en el envase original, en un lugar bien ventilado, lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Proteger del sol y humedad.

PRIMEROS AUXILIOS

Lávese las partes del cuerpo expuestas con agua y jabón. Si el producto entra en contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua corriente durante varios minutos. En caso de ingestión accidental y el paciente esta conciente, administrar carbón medicinal. Nunca administre nada por vía oral a pacientes en estado de inconciencia.

"Aleje a la persona del área contaminada"

RECOMENDACIONES AL MEDICO.

Grupo químico Avermectinas (lactona macrociclica).

Síntomas de intoxicación: Los primeros síntomas de intoxicación que se presentan son dilatación de la pupila, falta de coordinación y temblores.

En caso de intoxicación, retire a la persona intoxicada del área de contaminación y en caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua. Administre tratamiento sintomático.

EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

INSTRUCCIONES DE USO.

Sangha Gel es un producto recomendado para los siguientes tipos de cucarachas:

Cucaracha americana *Periplaneta americana*

Cucaracha oriental *Blatta orientalis*

Cucaracha germánica *Blatella germanica*

Dosis recomendada aproximada:

0,25 - 1,0 g/m₂

En lugares de infestaciones severas se recomienda no menos de 10 puntos/m₂

El punto de aplicación será de 0,5 cm. de diámetro aprox.

El producto es recomendado para su aplicación en Almacenes, cocinas, industria en general, plantas de preparación de alimentos, hoteles, hospitales, casas, aviones, barcos y cualquier lugar con problemas de cucarachas.

Evite mojar el cebo o aplicar si la superficie se encuentra mojada.

Aviso de garantía:

Allister de México S.A. de C.V. garantiza que dicho producto esta compuesto por los ingredientes que se especifican. No acepta responsabilidad alguna por daños a personas o daños a la propiedad ajena que pudieran resultar de su uso si no se cumple de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.

Registro RACO: RSCO- DOM-INAC-174-301-092-0.050

Hecho en México

Formulado por: Allister de México S.A. de C.V.

Circunvalación Sur #5

Col. Las Fuentes

Zapopan, Jalisco México

C.P. 45070